



MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION GENERALE DES SOINS ET SERVICES DE
SANTE

DIRECTION DE L'EPIDEMIOLOGIE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA MALADIE



SITREP NATIONAL N°03

Epidémie de Mpox

Date de notification du premier cas	: 09 janvier 2024
Période rapportée	: 27 mars au 06 avril 2024
Date de publication	: 08 avril 2024

I. POINTS SAILLANTS

- Notification d'un cas probable dans le district sanitaire d'Oyo-Alima, département de la Cuvette ;
- Enregistrement d'un décès communautaire dans le district sanitaire d'Oyo-Alima, département de la Cuvette ;
- Recherche active des cas dans les registres des centres de santé et dans la communauté dans le département de la Cuvette, des Plateaux et de la Likouala.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Total des cas	Cas confirmés	Cas probables	Cas suspects
59	19	10	30

Au total 59 cas ont été notifiés de la première à la 14^{ème} semaine épidémiologique de l'année 2024. Au cours de la période de rapportage, un cas probable a été notifié dans le district sanitaire d'Oyo-Alima, département de la Cuvette.

De la 7^{ème} à la 10^{ème} semaine, 15 cas ont été confirmés. De la 11^{ème} à la 14^{ème} semaine, aucun cas n'a été confirmé du fait qu'aucun prélèvement n'a été réalisé et envoyé au laboratoire national de santé publique.




Figure 1: Courbe épidémique de l'épidémie de MpoX par semaine épidémiologique, 2024

II-1. CARTOGRAPHIE DES CAS DE MPOX

1. Répartition des cas par département, district sanitaire et aire de santé

Le tableau ci-dessous présente la répartition des cas de MpoX par département et district sanitaire. A ce jour, 9 districts sanitaires de 5 départements du pays ont notifié au moins un cas présumé de MpoX comme illustré dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1: Répartition des cas de MpoX par département, district sanitaire et aire de santé, 2024

Département/DS	Cas suspects	Cas probables	Cas confirmés	Total
Cuvette	20	10	14	44
Mossaka Loukolela	11	2	12	25
Oyo-Alima	9	8	2	19
Likouala	3	0	2	5
Impfondo	3	0	2	5
Plateaux	0	0	2	2
Gamboma	0	0	2	2
Pointe-Noire	5	0	1	6
Ngoyo	2	0	1	3
Tié-Tié	2	0	0	2
Loandjili	1	0	0	1
Brazzaville	2	0	0	2
Makélékélé	1	0	0	1
Moungali	1	0	0	1
Total	30	10	19	59

II-2. CARACTERISTIQUES DES CAS CONFIRMES, PROBABLES ET SUSPECTS DE MPOX

1. Répartition des cas selon l'âge

L'âge moyen des cas est de 18,0 ans. Le cas le plus jeune a 4 mois et le plus âgé a 49 ans. Le tableau ci-dessous montre que 45,8% des cas sont âgés de 5 à 14 ans et 44,0% de 15 ans et plus. Les enfants de moins de 5 ans représentent 10,2% des cas. En ce qui concerne les cas confirmés, 57,9% sont âgés de plus de 15 ans, 36,8% de 5 à 14 ans et 5,3% de moins de 5 ans.

Tableau 2: Répartition des cas de Mpox par tranche d'âge

Tranche d'âge	Cas suspects		Cas probables		Cas confirmés		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
<5	4	13,3	1	10,0	1	5,3	6	10,2
5 à 14	15	50,0	5	50,0	7	36,8	27	45,8
>15	11	36,7	4	40,0	11	57,9	26	44,0
Total	30	100,0	10	100,0	19	100,0	59	100,0

2. Répartition des cas par sexe

La répartition par sexe est présentée dans le tableau ci-dessous. Il ressort de ce tableau que plus de la moitié des cas sont de sexe féminin (50,8%). Parmi les cas confirmés, plus de la moitié sont des hommes (57,9%).

Tableau 3: Répartition des cas de Mpox par sexe

Sexe	Cas suspects		Cas probables		Cas confirmés		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Féminin	15	50,0	7	70,0	8	42,1	30	50,8
Masculin	15	50,0	3	30,0	11	57,9	29	49,2
Total	30	100,0	10	100,0	19	100,0	59	100,0

3. Situation des décès

Au cours de la période de rapportage, 1 décès communautaire a été enregistré (un cas de sexe féminin âgé de 27 ans) dans le district sanitaire d'Oyo-Alima, département de la Cuvette. Ainsi, le taux de létalité de Mpox est estimé à 1,7%.

II-3. Principaux indicateurs

Indicateurs	Période couverte	
	Semaine 14	Cumul au 07/04/2024
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	0	37
Contacts	0	123
Contacts suivis	0	123
Contacts sortis du suivi	3	123
Cas suspects	0	30
Cas probables	1	10
Prélèvements réalisés par les EIR	0	32
LABORATOIRE		
Nombre de tests réalisés	0	32
Nombre de tests positifs	0	19
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	0
Nombre de cas évadés	0	0
Nombre de guéris	0	0
Nombre de décès	1	1

III. ACTIVITES DE LA RIPOSTE

III-1. Surveillance épidémiologique

- Recherche active des cas de Mpox dans les formations sanitaires et la communauté ;
- Investigation préliminaires autour des cas suspects ;
- Listage et suivi des contacts.

III-2. Communication sur les risques et engagement communautaire

- Sensibilisation des ménages et des établissements scolaires sur les mesures de prévention du Mpox.

III-3. Laboratoire

- Aucun prélèvement effectué.

IV. DEFIS

- Mobilisation des fonds pour l'organisation des réunions communautaires et la prise en charge des relais communautaires ;
- Organisation de l'isolement des cas ;

- Acquisition des médicaments pour la prise en charge des cas et des kits de prélèvement ;
- La restauration des cas dans les sites d'isolement ;
- Acquisition des intrants pour la désinfection des maisons des cas.

V. PROCHAINES ETAPES

- Actualisation du plan national de riposte.

Pour toute information, contactez :

Dr. Jean-Médard KANKOU, DELM, jkankou@yahoo.fr

M. Jethro MASSALA PEYA, Epidémiologiste, data manager, SURGE, DELM,
jethromassala@gmail.com